



KLOKA LISTAN

2022

Region Stockholms läkemedelskommittés
expertgrupp för
vaccinationer



Publika sidor om vaccinationer

- Vårdgivarguiden Smittskydd Stockholm – Vaccination
<https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/>
 - **Beställning av vacciner**
 - Prislista – vilka vacciner finns på avtal (inkl tabell för programvacciner)
 - Hur beställs vacciner
 - Restnoterade vacciner
 - Övrig information per vaccinationsområde
- Janusinfo – behandling – expertrådsutlåtanden
<https://janusinfo.se/behandling/expertradsutlatanden/vaccinationer>
 - [Allmän information om vaccinationer](#)
 - [Barnvaccinationer](#)
 - [Vaccination för vuxna](#)
 - [Vaccinationsrekommendationer för riskgrupper](#)
 - [Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi](#)
 - [Vägledning för användning av Zostavax – vaccin mot bältros](#)



Barnvaccinationsprogrammet

Sjukdom/vaccin	Barnhälsovård						Elevhälsa		
	6 veckor	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5-6 år	Åk 1-2	Åk 5-6	Åk 8-9
Rotavirus*	X	X							
Difteri		X	X	X		X			X
Stelkramp		X	X	X		X			X
Kikhosta		X	X	X		X			X
Polio		X	X	X		X			
Haemophilus influenzae typ B		X	X	X					
Hepatit B**		X	X	X					
Pneumokock-infektioner		X	X	X					
Mässling					X		X		
Påssjuka					X		X		
Röda hund					X		X		
HPV								X+X	

* Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2014

** Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2013



Vaccinationsrekommendationer friska vuxna

Vaccinrekommendationer friska vuxna

Sjukdom/vaccin	Ålder (år)						
	18–29	30–35	36–49	50–55	56–64	65–74	>75
Difteri-tetanus-pertussis dT _p ¹		X		X		X	
Vaccin mot säsongsinfluensa ²							
– alla							Årligen
– gravida från och med graviditetsvecka 17	X	X	X				
Vaccin mot pneumokocker ³ (Pneumovax)							En dos
Vaccin mot herpes zoster ⁴							En dos
Vaccin mot mässling – MPR ⁵	Två doser med minst en månads intervall om inte tidigare immun						

1. Booster dT_p rekommenderas vart 20:e år, booster vid 30-35 år samt 50-55 år motsvarar perioder i livet då många blir föräldrar eller mor-/far-föräldrar. För personer som har nära kontakt med spädbarn (<1 år) kan en boosterdos tidigareläggas för att minska risken för att barnet ska smittas med kikhosta. Det ska dock gå minst 10 år mellan doserna.
2. Vaccin mot säsongsinfluensa rekommenderas årligen från 65 års ålder. Friska gravida rekommenderas vaccination från och med graviditetsvecka 17. Så länge inte influensasäsongen startat kan vaccination skjutas på eftersom det nyfödda barnet får bättre skydd under sina första levnadsmånader ju senare under graviditeten vaccinet ges.
3. Pneumokockvaccin (Pneumovax), engångsdos, rekommenderas från 65 års ålder. Ingen revaccination.
4. Vaccin mot herpes zoster. Zostavax är ett levande vaccin som ges som en dos. Kan övervägas från 65 års ålder. Kan inte ges till immunsupprimerade.
5. Mässling-påssjuka-röda hund (MPR) rekommenderas till icke immuna personer, det vill säga personer som vet att de inte haft mässling och inte fått två doser vaccin. Det är framför allt hos personer födda 1960-1980 som det kan finnas osäkerhet kring immunitet.



Vaccination mot covid-19

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

- [Vaccination mot covid-19](#)



KLOKA LISTAN

2022

Tack!